

Geachte cliënt,

U heeft bij ons een behandeling ondergaan. Hieronder vindt u onze nazorgadviezen voor een optimaal resultaat.

Tot 4 uur	Niet voorover bukken	Niet tillen of persen
Tot 24 uur	Niet wrijven in de behandelde gebieden	Geen alcohol nuttigen
Tot 48 uur	Geen warmtebronnen opzoeken (zonnen, sauna, zonnebank, etc)	
Tot 1 week	Geen gezichtsbehandelingen	Geen massage, peelings of laserbehandelingen
Bij pijnklachten	Maximaal aanbevolen hoeveelheid paracetamol (zie de bijsluiter)	Het gebruik van ibuprofen, diclofenac en andere NSAID's raden wij af tot 1 week na de behandeling. Overleg bij twijfel met de behandelaar.



Bij koorts (38,5°C of hoger), pijn toename, roodheid en warmte rondom de injectieplaatsen na 72 uur neemt u contact op met de behandelaar.

Complicaties

Een medische ingreep kan gepaard gaan met complicaties. Hieronder vindt u complicaties/nevenwerkingen die kunnen optreden na uw behandeling.

Hoofdpijn of griepachtige verschijnselen gedurende enkele dagen van voorbijgaande aard.

Lichte zwelling of roodheid van voorbijgaande aard.

Injectiepijn van voorbijgaande aard

Bloeduitstortingen (blauwe plekken). Verdwijnen na 5-10 dagen

Allergische reactie (zeer zeldzaam; <0.1%). Neem bij klachten van benauwdheid, opgezwollen gezicht of algehele roodheid van de huid contact op met uw behandelaar.

Let op mogelijke asymmetrie in de eerste weken

Het is mogelijk dat er in de eerste 1 à 2 weken na de behandeling lichte asymmetrie zichtbaar is. Dit komt doordat botuline toxine (Botox) aan de ene kant van het gezicht soms iets sneller of sterker kan inwerken dan aan de andere kant. Dit effect is doorgaans tijdelijk. Na ongeveer 14 dagen is het eindresultaat goed te beoordelen. Eventuele correcties kunnen dan, indien nodig, worden besproken.